

PRÉVENTION ■ La prise en charge rapide des malades évoquée par le docteur Rochette

Maladie d'Alzheimer : l'importance du dépistage précoce

Si une chose est à retenir sur cette conférence débat, sur la maladie d'Alzheimer, qui a eu lieu récemment, dans la salle polyvalente, de l'EPHAD sud de Saint-Yrieix, c'est que le dépistage précoce est important car il permet une prise en charge rapide des malades.

Dernièrement, le docteur Rochette, gériatre au centre hospitalier Jacques-Boutard à Saint-Yrieix, a présenté un exposé sur la maladie d'Alzheimer qui touche, en Limousin, un nombre important de personnes. Ceci s'explique par le fait que la population limousine est vieillissante. Les signes précurseurs de la maladie sont des troubles co-

gnitifs et/ou du comportement. Dès les premiers signes repérés, un dépistage précoce peut être fait. Il faut consulter son médecin traitant qui renvoie vers un spécialiste ou un organisme adaptés. Une consultation mémoire peut avoir lieu pour faire un bilan. Si nécessaire, le spécialiste pourra prescrire un traitement qui de nos jours n'est pas encore curatif mais de confort, aidant à réduire les troubles caractéristiques. La maladie concerne les patients atteints mais aussi leur entourage, 70 % des patients atteints sont pris en charge par un proche et ce, six heures par jour (minimum) et sept jours sur sept. De plus,



CONFÉRENCE. Le Dr Rochette a fait un exposé complet sur la maladie d'Alzheimer et les aidants

ces patients sont des dépressifs sous-jacents difficiles à encadrer. Il faut donc être vigilant et apporter du soutien aux proches de ces personnes. Les MAIA (Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer) jouent dans ce domaine un rôle important. Elles permettent aux aidants de lâcher prise et les aident pour certaines démarches. Elles peuvent être le coordinateur privilégié de tous les intervenants qui s'occupe de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer (kiné, infirmière, médecin, aides-soignantes à domicile, etc). Une hospitalisation temporaire du malade peut aussi être envisagée selon les cas. ■